

| | | | |
|--------|-------|----------|---------|
| レジメン番号 | 0116 | レジメン名 | PTX bw |
| 登録診療科 | 消化管内科 | 使用薬剤 | パクリタキセル |
| がん腫 | 胃癌 | インターバル日数 | 14日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | ・・・Day14 | Day1 (/) |
|-------------------------------------|------|-------|---------------|----------|---------------|
| パクリタキセル(PTX) 80mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | 2週間を1コース | ↓ |

支持療法

| 薬品名 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | ・・・Day14 | Day1 (/) |
|--|------|-------------------------|---------------|----------|---------------|
| デキサート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body | 点滴 | 初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg | ↑ | 2週間を1コース | ↑ |
| ファモチジン 20mg/body | 点滴 | 20mg | ↑ | | ↑ |
| ネオレスタール 10mg/body | 点滴 | 10mg | ↑ | | ↑ |
| グラニセトロン 1mg/body | 点滴 | 1mg | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-----------|----------------------------------|----------|---------|
| ① パクリタキセル | 30mg | 生食 250mL | 60分/点滴 |
| | 100mg | | |
| ② | デキサート 初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| | ファモチジン | | |
| | ネオレスタール | | |
| ③ | グラニセトロン | 生食 100mL | 30分/点滴 |
| ④ | 生食 | 50mL | 5分/点滴 |

投与間隔>> (15分) (30分) (60分) (5分)
 投与順番>> ② → ③ → ① → ④ → 終了

【備考】

.....

.....

.....

.....

.....

.....

