

レジメン番号	0164	レジメン名	Cetuximab+CPT-11weekly3&2
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	アービタックス、トポテシン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	35日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	Day15 ( / )	Day22 ( / )	Day29 ( / )	・・・Day35	Day1 ( / )
トポテシン(CPT-11) 100mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓	↓	↓			5週間を1コース	↓
アービタックス (Cetuximab) 初回 400mg/ m <sup>2</sup> /日 以後 250mg/ m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○を mg	↑	↑	↑			5週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	8mg	↑	↑	↑	↑	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑	↑	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
②アービタックス	100mg	生食 250mL	下記参照/点滴
③ アロキシ または グラニセトロン デキサート ネオレスタール	0.75mg	生食 100mL	全開/点滴
	1mg		
	4mg		
	10mg		
④ 生食	100ml	生食 100ml	30分/点滴
⑤ 生食	100ml	生食 100ml	下記参照/点滴



【備考】

② アービタックス投与速度：初回 120分/2回目以降 60分

⑤ 生食 アービタックス投与終了後からトポテシン投与開始までの時間 初回 60分/2回目以降 15分