

レジメン番号	0167	レジメン名	AVASTIN+IFL
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	アバスチン、トポテシン、 レボホリナート、フルオロウラシル
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day14	Day1 ( / )
レボホリナート(1-LV) 250mg/ m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
フルオロウラシル(5FU) 500mg/ m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓		↓
トポテシン(CPT-11) 150mg/ m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓		↓
アバスチン(Bevacizumab) 5mg/ kg/日	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑	2週間を1コース	↑
デカドロン 6.6mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
②フルオロウラシル	250mg	生食 50mL	全開/点滴
③トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
④アバスチン	100mg	生食 100mL	下記参照/点滴
	400mg		
⑤ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
	1mg		
	3.3mg		



【備考】

④ アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分