

レジメン番号	0170	レジメン名	AVASTIN+mFOLFOX7
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	アバスチン、エルプラット、 レボホリナート、フルオロウラシル
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14 日

【投与量・投与スケジュール】

【1~8、17~24】コース目

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
レボホリナート(L-LV) 200mg/ m ² /日	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
エルプラット(L-OHP) 85mg/ m ² /日	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル(5FU) 2400mg/ m ² /日	持続注入	mg	↓		↓
アバスチン(Bevacizumab) 5mg/ kg/日	点滴	mg	↓		↓

【9~16】コース目

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
レボホリナート(L-LV) 200mg/ m ² /日	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
フルオロウラシル(5FU) 2400mg/ m ² /日	持続注入	mg	↓		↓
アバスチン(Bevacizumab) 5mg/ kg/日	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート	25mg 100mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
②フルオロウラシル	250mg 1000mg	生食適量	46hr 持続注入
③エルプラット	100mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
④アバスチン	100mg 400mg	生食 100mL	下記参照/点滴
⑤ アロキシ グラニセトロン デキサート	0.75mg 1mg 4mg	5%ブドウ糖液 100mL	30分/点滴

投与間隔》 (下記参照) (30分) ③ (120分) 46時間
(持続注入) 終
投与順番》 ④ → ⑤ → ① → ② → 了

【備考】

④ アバスチン投与速度：初回 90 分／2 回目 60 分／3 回目以降 30 分