

レジメン番号	0528	レジメン名	XELOX(小腸癌)[末梢][ポート]
登録診療科	総合消化器外科、臨床腫瘍科	使用薬剤	ゼローダ、エルプラット
がん腫	小腸癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day2~14	…Day21	Day1 ( / )
エルプラット(1-OHP) 130mg/ m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓		3週間を1コース	↓
ゼローダ 2000mg/ m <sup>2</sup> /日	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ (0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		3週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①エルプラット	100mg	5%ブドウ糖液 500mL	120分/点滴
② アロキシ グラニセトロン デキサート(ポート)	0.75mg	5%ブドウ糖液 100mL	30分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
デキサート(末梢)	下記参照		

投与間隔≫ (30分) (120分)  
 投与順番≫ ② → ① → 終了

【備考】

【末梢から投与の場合】

- ・エルプラット点滴内(Rp.2)にデキサート 1.65mg 1A を混注。
- ・前投薬(Rp.1)のデキサートは 4.95mg(3.3mg 1A+1.65mg 1A)とする。