

レジメン番号	0622	レジメン名	CDDP+S-1(尿膜管癌)
登録診療科	臨床腫瘍科	使用薬剤	シスプラチン、エスワンタイホウ
がん腫	尿膜管癌	インターバル日数	35日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1~7 ( / ~ / )	Day8 ( / )	Day9~21 ( / ~ / )	・・・Day35	Day1 ( / )
シスプラチン (CDDP) 60mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg		↓		5週間を1コース	
エスワンタイホウ(S-1) ※下記参照	内服	mg	↓↓	↓	↓↓		↓↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	mg		↑		5週間を1コース	
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg		↑			
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	A		↑			
マンニトール 200mL/body	点滴	mL		↑			
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg		↑			

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① シスプラチン	10mg	生食 500mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
② アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
③ 硫酸マグネシウム		生食 500mL	60分/点滴
④ マンニトール	300mL		30分/点滴
⑤ 生食	500mL		60分/点滴
⑥ プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴

投与間隔≫ (30分) (15分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番≫ ⑥ → ② → ③ → ④ → ① → ⑤ → 終了

【備考】

S-1 : Day1-Day21 に服用(3週間服用 2週間休薬)

投与量 : BSA < 1.25 m<sup>2</sup> : 80mg/day

1.25 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.5 m<sup>2</sup> : 100mg/day

BSA ≥ 1.5 m<sup>2</sup> : 120mg/day 最大 120mg/day

⑥プロイメンド : 内服アプレピタント (day1 125mg、day2以降 80mg) 使用の場合は投与しない