

| | | | |
|--------|---------|----------|----------------|
| レジメン番号 | 0631 | レジメン名 | S-1+PTX(iv/ip) |
| 登録診療科 | 膀胱癌 | 使用薬剤 | パクリタキセル |
| がん腫 | 総合消化器外科 | インターバル日数 | 21日 |

【投与量・投与スケジュール】


| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day 8 (/) | …Day21 | Day1 (/) |
|-------------------------------------|------|-------|---------------|----------------|----------|---------------|
| パクリタキセル(PTX) 50mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | ↓ | 3週間を1コース | ↓ |
| パクリタキセル(PTX) 20mg/m ² | 腹腔内 | mg | ↓ | ↓ | | ↓ |

支持療法

| 薬品名 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day 8 (/) | …Day21 | Day1 (/) |
|--|------|-------|---------------|----------------|----------|---------------|
| デキサート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | 3週間を1コース | ↑ |
| ファモチジン 20mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | | ↑ |
| ネオレスタール 10mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | | ↑ |
| グラニセトロン 1mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|----------------|---------|-----------|----------|
| ①パクリタキセル (点滴) | 30mg | 生食 250mL | 60分/点滴 |
| | 100mg | | |
| ②パクリタキセル (腹腔内) | 30mg | 生食 1000mL | 120分/腹腔内 |
| | 100mg | | |
| ③ | デキサート | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| | ファモチジン | | |
| | ネオレスタール | | |
| ④ | グラニセトロン | 生食 100mL | 30分/点滴 |
| ⑤ | 生食 | 50mL | 5分/点滴 |



【備考】

S-1 : Day1-Day14 に服用(2週間服用 1週間休薬)

投与量 : BSA < 1.25 m² : 80mg/day

1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m² : 100mg/day

BSA ≥ 1.5 m² : 120mg/day