

レジメン番号	0663	レジメン名	CBDCA+PEM+ニボルマブ+イピリムマブ(Ad)
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、アリムタ、 オプジーボ、ヤーボイ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	42日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day22 (/)	…Day42	Day1 (/)
オプジーボ 360mg/body	点滴	mg	↓	↓	6週間を1コース	↓
ヤーボイ 1mg/kg	点滴	mg	↓			↓
アリムタ(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6: Calvert 式)	点滴	mg	↓	↓		↓
(支持療法)						
アロキシ 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑	↑	6週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①オプジーボ	120mg	生食 100mL	30分/点滴
	240mg		
②ヤーボイ	50mg	生食 100mL	30分/点滴
③アリムタ	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
④カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
⑤	アロキシ 0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑥プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑦生食	100mL		15分/点滴
⑧生食	100mL		30分/点滴
⑨生食	100mL		30分/点滴
⑩生食	50mL		5分/点滴

Day1

投与時間>	(15分)	(30分)	(30分)	(30分)	(30分)	(30分)	(15分)	(10分)	(60分)	(5分)	
投与順>	⑦	①	⑧	②	⑨	⑥	⑤	③	④	⑩	終了

Day22

投与時間>	(15分)	(30分)	(30分)	(30分)	(15分)	(10分)	(60分)	(5分)	
投与順>	⑦	①	⑧	⑥	⑤	③	④	⑩	終了

【備考】

⑥プロイメンド：内服アプレピタント（day1 125mg、day2以降 80mg）使用の場合は投与しない

・投与7日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を9週に1回行い、

投与最終日から22日目まで継続する。

・デカドロン 4mg 2T/2×朝昼 点滴翌日から3日間