

レジメン番号	0664	レジメン名	CDDP+PEM+ニボルマブ+イピリムマブ(Ad)
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、アリムタ、 オプジーボ、ヤーボイ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	42日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day22 ( / )	…Day42	Day1 ( / )
オプジーボ 360mg/body	点滴	mg	↓	↓	6週間を1コース	↓
ヤーボイ 1mg/kg	点滴	mg	↓			↓
アリムタ(PEM) 500mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓		↓
シスプラチン(CDDP) 75 mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓		↓
(支持療法)						
アロキシ 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑	↑	6週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑	↑		↑
硫酸マグネシウム 20mL 0.4A/body	点滴	0.4A	↑	↑		↑
マンニトール S 200mL/body	点滴	200mL	↑	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①オプジーボ	120mg	生食 100mL	30分/点滴
	240mg		
②ヤーボイ	50mg	生食 100mL	30分/点滴
③アリムタ	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
④シスプラチン	10mg	生食 300mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
⑤	アロキシ 0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑥	プロイメンド 150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑦	硫酸マグネシウム 20mL	生食 500mL	60分/点滴
⑧	マンニトール S 300mL		30分/点滴
⑨	生食 100mL		15分/点滴
⑩	生食 100mL		30分/点滴
⑪	生食 100mL		30分/点滴
⑫	生食 500mL		60分/点滴

Day1

投与

時間>> (15分) (30分) (30分) (30分) (30分) (30分) (15分) (10分)

投与順>> ⑨ → ① → ⑩ → ② → ⑪ → ⑥ → ⑤ → ③ →

(60分) (30分) (60分) (60分)

→ ⑦ → ⑧ → ④ → ⑫ → 終了

Day22

投与

時間>> (15分) (30分) (30分) (30分) (15分) (10分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順>> ⑨ → ① → ⑩ → ⑥ → ⑤ → ③ → ⑦ → ⑧ → ④ → ⑫ → 終了

【備考】

⑥プロイメンド：内服アプレピタント（day1 125mg、day2 以降 80mg）使用の場合は投与しない

・投与7日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を9週に1回行い、

投与最終日から22日目まで継続する。

・デカドロン 4mg 2T/2×朝昼 点滴翌日から3日間