

レジメン番号	0152	レジメン名	CBDCA+PEM(中皮腫)
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、アリムタ
がん腫	悪性胸膜中皮腫	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
アリムタ(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6: Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑	3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アリムタ	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
②カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
③ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
④プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑤生食	50 mL		5分/点滴

投与間隔≫ (30分) (15分) (10分) (60分) (5分)
 投与順番≫ ④ → ③ → ① → ② → ⑤ → 終了

【備考】

④ プロイメンド：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない

・投与7日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバル 2A 筋注を9週に1回行い、

投与最終日から22日目まで継続する。