

レジメン番号	0273	レジメン名	CDDP+GEM
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、ジェムザール
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	・・・Day21	Day1 ( / )
ジェムザール (GEM) 1000mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓	↓	3週間を1コース	↓
シスプラチン (CDDP) 80mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓			↓

(支持療法)

薬品名	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	・・・Day21	Day1 ( / )
デカドロン (day1) 9.9mg/body (day8) 6.6mg/body	点滴	(day1) 9.9 mg (day8) 6.6 mg	↑ (9.9mg)	↑ (6.6mg)	3週間を1コース	↑
A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	↑			↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	0.4A	↑			↑
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェムザール	1000mg	生食 100mL	30分/点滴
	200mg		
②シスプラチン	10mg	生食 500mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
③ アロキシ グラニセトロン または デキサート (day1) デキサート (day8)	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
	3.3mg		
④プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑤硫酸マグネシウム		生食 500mL	60分/点滴
⑥マンニトール	200mL		30分/点滴
⑦生食	500mL		60分/点滴
⑧生食	50mL		5分/点滴

(day1)

投与間隔>> (30分) (15分) (30分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番>> ④ → ③ → ① → ⑤ → ⑥ → ② → ⑦ → 終了

(day8)

投与間隔>> (15分) (30分) (5分)

投与順番>> ③ → ① → ⑧ → 終了

【備考】

④ プロイメンド：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない

