

レジメン番号	0387	レジメン名	CDDP+S-1+放射線
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、エスワンタイホウ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2~14	・・・Day28	Day1 (/)
シスプラチン (CDDP) 60mg/m ²	点滴	mg	↓		4週間を1コース	↓
エスワンタイホウ(S-1) ※下記参照	内服	mg	↓	↓		

(支持療法)

薬品名	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2~14	・・・Day28	Day1 (/)
A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑		4週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑			↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	↑			↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	0.4A	↑			↑
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① シスプラチン	10mg	生食 500mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
② アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
③ プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
④ 硫酸マグネシウム		生食 500mL	60分/点滴
⑤ マンニトール	300mL		30分/点滴
⑥ 生食	500mL		60分/点滴

投与間隔>> (30分) (15分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番>> ③ → ② → ④ → ⑤ → ① → ⑥ → 終了

【備考】

エスワンタイホウ：Day1-Day14に服用(2週間服用 2週間休薬)

投与量：BSA < 1.25 m²：80mg/day

1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m²：100mg/day

BSA ≥ 1.5 m²：120mg/day 最大 120mg/day

③ プロイメンド：内服アプレピタント (day1 125mg、day2以降 80mg) 使用の場合は投与しない

放射線併用：60Gy/6週間