

| | | | |
|--------|--------|----------|--------------|
| レジメン番号 | 0392 | レジメン名 | CDDP+PEM+放射線 |
| 登録診療科 | 呼吸器内科 | 使用薬剤 | シスプラチン、アリムタ |
| がん腫 | 非小細胞肺癌 | インターバル日数 | 21日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | ・・・Day21 | Day1 (/) |
|-------------------------------------|------|-------|---------------|----------|---------------|
| アリムタ(PEM) 500mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | 3週間を1コース | ↓ |
| シスプラチン(CDDP) 75mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | | ↓ |

(支持療法)

| A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1) | 点滴 | ○ を mg | ↑ | 3週間を1コース | ↑ |
|--------------------------------|----|-----------|---|----------|---|
| デキサート 9.9mg/body | 点滴 | 9.9mg | ↑ | | ↑ |
| プロイメンド 150mg/body | 点滴 | 150mg | ↑ | | ↑ |
| 硫酸マグネシウム 0.4A/body | 点滴 | 0.4A | ↑ | | ↑ |
| マンニトール 200mL/body | 点滴 | 200mL | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-----------------------------------|--------|----------|---------|
| ①アリムタ | 100mg | 生食 100mL | 10分/点滴 |
| | 500mg | | |
| ②シスプラチン | 10mg | 生食 500mL | 60分/点滴 |
| | 25mg | | |
| | 50mg | | |
| ③ アロキシ または グラニセトロン デキサート | 0.75mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| | 1mg | | |
| | 3.3mg | | |
| ④ プロイメンド | 150mg | 生食 250mL | 30分/点滴 |
| ⑤ 硫酸マグネシウム | | 生食 500mL | 60分/点滴 |
| ⑥ マンニトール | 200mL | | 30分/点滴 |
| ⑦ 生食 | 500mL | | 60分/点滴 |

投与間隔≫ (30分) (15分) (10分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番≫ ④ → ③ → ① → ⑤ → ⑥ → ② → ⑦ → 終了

【備考】

③ プロイメンド：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない