

レジメン番号	0253	レジメン名	MTX+5FU
登録診療科	臨床腫瘍科、消化管内科、 総合消化器外科	使用薬剤	メソトレキセート、フルオロウラシル
がん腫	胃癌	インターバル日数	7日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day7	Day1 ( / )
メソトレキセート(MTX) 100mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	1週間を1コース	↓
フルオロウラシル(5-FU) 600mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

A)パロノセトロン(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	○ mg	↑	1週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑
ダイアモックス(500)	静注	0.5V	↑		↑
メイロン(8.4%20mL)	点滴	2A	↑		↑
ロイコボリン錠(5mg)	内服	15mg / 回	※下記参照		

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①メソトレキセート	5mg	生食 100mL	15分/点滴
	50mg		
②フルオロウラシル	250mg	生食 100mL	15分/点滴
③ パロノセトロン または グラニセトロン または デキサート	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
④ダイアモックス	500mg	生食 20ml	静注
⑤メイロン	20ml	生食 500mL	2時間/点滴
⑥生食	50ml		5分/点滴

投与順番≫ (15分) (静注) (15分) (2時間) (15分) (5分)  
 ③ → ④ → ① → ⑤ → ② → ⑥ → 終了

【備考】

※ロイコボリン錠：MTX投与開始24時間後から6時間毎に6回投与