

レジメン番号	0260	レジメン名	CBDCA+セツキシマブ
登録診療科	臨床腫瘍科、耳鼻咽喉科、 口腔外科	使用薬剤	カルボプラチン、アービタックス
がん腫	頭頸部癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	…Day21	Day1 (/)
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓			3週間を1コース	↓
アービタックス 初回 400mg/m ² 以降 250mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

デキサート 9.9mg/body(Day1) 6.6mg/body(Day8,15)	点滴	(Day1) 9.9mg (Day8,15) 6.6mg	↑	↑	↑	3週間を1コース	↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	3mg	↑				↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
②アービタックス	100mg	生食 500mL(初回)	※1 下記参照
		生食 250mL(以降)	
③	デキサート 9.9mg/body(Day1)	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 6.6mg/body(Day8,15)		
	グラニセトロン(Day1のみ)		
	ネオレスタール		
④ 生食	100mL		30分/点滴
⑤ 生食	250mL		60分/点滴
⑥ 生食	50 mL		5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (※1) (60分) (60分) (5分)

投与順番≫ ③ → ④ → ② → ⑤ → ① → ⑥ → 終了

【備考】

※1 アービタックス投与速度：初回 120分/2回目以降 60分