| レジメン番号 | 0264 | レジメン名 | エトポシド療法 |
|---|---|---|---|
| 登録診療科 | 臨床腫瘍科、泌尿器科 | 使用薬剤 | エトポシド |
| がん種 | 尿路上皮癌 | インターバル日数 | 21 日 |

【投与量・投与スケジュール】

## ◇レジメン No.264　《尿路上皮癌：エトポシド療法》　臨床腫瘍科・泌尿器科

| 薬品名<br>投与量／体表面積 | 投与<br>方法 | 患者投与量 | Day1<br>( / ) | Day2<br>( / ) | Day3<br>( / ) | ･･･Day21 | Day1<br>( / ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エトポシド（VP-16）<br>100mg/m² | 点滴 | mg | ↓ | ↓ | ↓ | 3 週間を 1 コース | ↓ |

（支持療法）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デキサート<br>6.6mg/body | 点滴 | 6.6mg | ↑ | ↑ | ↑ | 3 週間を 1 コース | ↑ |
| A）パロノセトロン(0.75)<br>B）グラニセトロン(1) | 点滴 | ◯を<br>mg | ↑ | （↑） | （↑） | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|---|---|---|---|---|
| ① エトポシド | | 100mg | 生食 500mL | 90 分/点滴 |
| ② デキサート | | 3.3mg | 生食 100mL | 15 分/点滴 |
| ② パロノセトロン | または | 0.75mg | | |
| ② グラニセトロン | | 1mg | | |
| ③ 生食 | | 50ml | フラッシュ用 | 5 分/点滴 |

投与間隔≫　　(15 分)　　(90 分)　　(5 分)

投与順番≫　②　⟶　①　⟶　③　⟶　終了

【備考】