

レジメン番号	0289	レジメン名	MVACa
登録診療科	臨床腫瘍科、泌尿器科	使用薬剤	メソトレキセート、エクザール、ドキソルビシン、カルボプラチン
がん腫	膀胱癌	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day2 ( / )	Day15 ( / )	Day22 ( / )	…Day28	Day1 ( / )
メソトレキセート(MTX) 30mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓	↓	4週間を1コース	↓
エクザール(VBL) 3mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg		↓	↓	↓		
ドキソルビシン(DXR) 30mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg		↓				
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=4.5 : Calvert 式)	点滴	mg		↓				

(支持療法)

デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg		↑			4週間を1コース	
A) パロノセトロン(0.75mg) B) グラニセトロン(1mg)	点滴	を mg		↑	↑	↑		

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①メソトレキセート	5mg	生食 100ml	15分/点滴
	50mg		
②エクザール	10mg	生食 100ml	15分/点滴
③ドキソルビシン	10mg	生食 100ml	15分/点滴
	50mg		
④カルボプラチン	50mg	生食 250ml	60分/点滴
	150mg		
⑤ デキサート パロノセトロン または グラニセトロン	3.3mg	生食 100ml	15分/点滴
	0.75mg		
	1mg		
⑥ パロノセトロン または グラニセトロン	0.75mg	生食 100ml	15分/点滴
	1mg		
⑦ 生食	100ml		15分/点滴
⑧ 生食	50ml		5分/点滴

【Day1】

投与間隔>> (15分) (15分) (5分)  
 投与順番>> ⑦ → ① → ⑧ → 終了

【Day2】

投与間隔>> (15分) (15分) (15分) (60分) (5分)  
 投与順番>> ⑤ → ③ → ② → ④ → ⑧ → 終了

【Day15,22】

投与間隔>> (15分) (15分) (15分) (5分)  
 投与順番>> ⑥ → ① → ② → ⑧ → 終了

【備考】

※ロイコボリン錠：10mg/回 を6時間毎に4回投与

