

レジメン番号	0343	レジメン名	FOLFIRI(臨床試験)
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	トポテシン、レボホリナート、フルオロウラシル
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day14	Day1 ( / )
トポテシン(CPT-11) 180mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
レボホリナート(1-LV) 200mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル(5FU) 400mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル(5FU) 2400mg/m <sup>2</sup>	持続注入	mg	↓		↓

(支持療法)

A)パロノセトロン(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	○を mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6 mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
②レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
③フルオロウラシル	250mg	生食 50mL	5分/点滴
④フルオロウラシル	250mg	生食適量	46hr 持続注入
⑤	パロノセトロン	5%ブドウ糖液 100mL	30分/点滴
	または グラニセトロン		
	デキサート		



【備考】

.....

.....

.....