

レジメン番号	0344	レジメン名	Bev+FOLFIRI(臨床試験)
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	アバスチン、トポテシン、レボホリナート、フルオロウラシル
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day14	Day1 ( / )
アバスチン(Bev) 5mg/kg	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
トポテシン(CPT-11) 180mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
レボホリナート(l-LV) 200mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル(5FU) 400mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル(5FU) 2400mg/m <sup>2</sup>	持続注入	mg	↓		↓

(支持療法)

A)パロノセトロン(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6 mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アバスチン	100mg	生食 100mL	下記参照/点滴
	400mg		
②トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
③レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
④フルオロウラシル	250mg	生食 50mL	5分/点滴
⑤フルオロウラシル	250mg	生食適量	46hr 持続注入
⑥ パロノセトロン または グラニセトロン デキサート	0.75mg	5%ブドウ糖液 100mL	30分/点滴
	1mg		
	3.3mg		



【備考】

アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分