

レジメン番号	0350	レジメン名	PTX+CBDCA+RT
登録診療科	臨床腫瘍科	使用薬剤	パクリタキセル、カルボプラチン
がん腫	食道癌	インターバル日数	35日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day 15 (/)	Day 22 (/)	Day 29 (/)	…Day35	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 50mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	5週間を1コース	↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=2: Calvert 式)	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓		↓

支持療法

薬品名	投与方法	初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg	↑	↑	↑	↑	↑	5週間を1コース	↑	
デキササート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body	点滴									
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑	↑	↑	↑	↑			↑
ネオレストール 10mg/body	点滴	10mg	↑	↑	↑	↑	↑			↑
A) パロノセトロン(0.75mg) B) グラニセトロン(1mg)	点滴	を mg	↑	↑	↑	↑	↑		↑	

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①パクリタキセル	30mg	生食 250mL	60分/点滴
	100mg		
②カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
③	デキササート 初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン		
	ネオレストール		
④	パロノセトロン または グラニセトロン	生食 100mL	30分/点滴
	0.75mg 1mg		
⑤ 生食	50mL		5分/点滴

投与間隔>> (15分) (30分) (60分) (60分) (5分)

投与順番>> ③ → ④ → ① → ② → ⑤ → 終了

【備考】

※RT(放射線治療)は原則併用する。

