

レジメン番号	0449	レジメン名	LCH 導入
登録診療科	臨床腫瘍科	使用薬剤	エクザール、プレドニゾン
がん腫	ランゲルハンス細胞組織球症	インターバル日数	42 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	Day22 (/)	Day29 (/)	Day36 (/)	…Day42
エクザール(VBL) 6mg/m ²	静注	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
プレドニゾン(PSL) 40mg/ m ²	経口		※Day1~42						

(支持療法)

グラニセトロン(1mg)	点滴	3mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
--------------	----	-----	---	---	---	---	---	---	--

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①エクザール	10mg	生食 20ml	静注
②グラニセトロン	1mg	生食 100ml	15 分/点滴
③生食	100mL		メインルート

投与間隔≫ (メインルート) (15 分) (静注)

投与順番≫ ③ → ② → ① → 終了

【備考】

※プレドニゾン(40mg/m²) : 4 週内服後 2 週間かけて 1 週毎に漸減(合計 6 週内服)