

レジメン番号	0593	レジメン名	カルボプラチン(セミノーマ)
登録診療科	臨床腫瘍科	使用薬剤	カルボプラチン
がん腫	セミノーマ	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	・・・Day28	Day1 ( / )
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=7 : Calvert 式)	点滴	mg	↓	4週間を1コース	↓

(支持療法)

デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑	4週間を1コース	↑
A) パロノセトロン (0.75) B) グラニセトロン (1)	点滴	○ を mg	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
② デキサート アロキシ グラニセトロン または	3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	0.75mg		
	1mg		
③プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
④生食	50mL	生食 50mL	5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (15分) (60分) (5分)  
 投与順番≫ ③ → ② → ① → ④ → 終了

【備考】

最大投与回数：2回

③ プロイメンド：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない