

レジメン番号	0655	レジメン名	EMA/CO(day8)
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	コスメゲン、エトポシド、オンコビン、メソトレキサート、エンドキサン
がん腫	絨毛癌・絨毛性疾患	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1	Day2	Day3		Day8 (/)	…Day14	Day1 (/)
コスメゲン 0.5mg/body	点滴	mg	↓	↓		※入院にて実施済み		2週間を1コース	↓
エトポシド(VP-16) 100 mg/m ²	点滴	mg	↓	↓					↓
メソトレキサート(MTX) 100 mg/m ²	点滴	mg	↓						↓
メソトレキサート(MTX) 200 mg/m ²	点滴	mg	↓						↓
オンコビン(VCR) 1.0mg/m ²	静注	mg					↓		
エンドキサン(CPA) 600mg/m ²	静注	mg					↓		

(支持療法)

グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	↑			↑	2週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑					↑
ロイコボリン 15mg/body	点滴	15mg		↑↑	↑↑				

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①オンコビン	1mg	生食 50mL	5分/点滴
②エンドキサン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
	500mg		
③	グラニセトロン 1mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
④生食	100mL		1時間/メインルート
⑤生食	50ml		5分/点滴

《day8》

投与間隔≫ (1時間
メインルート) (15分) (5分) (30分) (5分)

投与順番≫ ④ → ③ → ① → ② → ⑤ → 終了

【備考】

Day1~3 は入院で実施。Day8 のみ外来で実施。