

| | | | |
|--------|------------|----------|--------------------------|
| レジメン番号 | 17 | レジメン名 | CMF classical (CPA 内服) |
| 登録診療科 | 乳腺外科・内分泌外科 | 使用薬剤 | エンドキサン、メソトレキセート、フルオロウラシル |
| がん腫 | 乳癌 | インターバル日数 | 28 日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | 2~7 (/) | Day8 (/) | 9~14 (/) | …Day28 | Day1 (/) |
|--|------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| エンドキサン(CPA) 100mg/body | 経口 | mg | ↓ | ↓↓↓↓↓ | ↓ | ↓↓↓↓↓ | 4週間を 1コース | ↓ |
| メソトレキセート(MTX) 40mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | | ↓ | | | ↓ |
| フルオロウラシル(5-FU) 600mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | | ↓ | | | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----|---|--|---|--|--------------|---|
| A)パロノセトロン(0.75) B)グラニセトロン(1) | 点滴 | mg | ↑ | | ↑ | | 4週間を 1コース | ↑ |
| デキサート 6.6mg/body | 点滴 | mg | ↑ | | ↑ | | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-------------------------------|--------|----------|---------|
| ①メソトレキセート | 5mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| | 50mg | | |
| ②フルオロウラシル | 250mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| ③ パロノセトロン グラニセトロン デキサート | 0.75mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| | 1mg | | |
| | 3.3mg | | |
| ④ 生食 | 50ml | | 5分/点滴 |

投与間隔》 (15分) (15分) (15分) (5分)
 投与順番》 ③ → ① → ② → ④ → 終了

【備考】