レジメン番号	28	**レジメン名**	NED+CPT11：weekly 3&1
登録診療科	産婦人科	**使用薬剤**	アクプラ、トポテシン
がん腫	子宮頸癌	**インターバル日数**	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	**患者投与量**	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	･･･Dya28	Day1 (/)
トポテシン(CPT11) 50～60mg/m²/日	点滴	**mg**	↓	↓	↓	4 週間を 1 コースとして 6 コース繰り返す	↓
アクプラ（NED) 30～40mg/m²/日	点滴	**mg**	↓	↓	↓		↓

（支持療法）

デキサート＊ 9.9mg/body	点滴	**mg**	↑	↑	↑	4 週間を 1 コースとして 6 コース繰り返す	↑
A) パロノセトロン(0.75) **B) グラニセトロン(1)**	点滴	**mg**	↑	↑	↑		↑

＊ステロイドは他剤へ変更・省略可

【当日の投与方法】

薬品名			規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン(CPT11)			40mg 100mg	生食 250mL	90 分/点滴
②アクプラ（NED)			50mg	生食 250mL	90 分/点滴
③	**デキサート**		3.3mg	生食 100mL	15 分/点滴
	パロノセトロン	または	0.75mg		
	グラニセトロン		1mg		

投与間隔≫　(15 分)　(90 分)　(90 分)

投与順番≫　③ ⟶ ② ⟶ ① ⟶ 終了（場合により内服薬あり）

【備考】