

レジメン番号	34	レジメン名	TC(PTX+CBDCA)weekly3&1
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	パクリタキセル、カルボプラチン
がん腫	卵巣癌	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day 8 (/)	Day 15 (/)	…Day28	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 70~80mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	4週間を1コース	↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=2 : Calvert 式)	点滴	mg	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

デキサート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	4週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑
グラニセトロン(1mg)	点滴	mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①	パクリタキセル	30mg	生食 250mL	60分/点滴
		100mg		
②	カルボプラチン	50mg	生食 250mL	90分/点滴
		150mg		
③	デキサート	初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg	3.3mg 生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン	20mg		
	ネオレスタール	10mg		
④	グラニセトロン	1mg	生食 100mL	30分/点滴
⑤	生食	50mL		5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (60分) (90分) (5分)
 投与順番≫ ③ → ④ → ① → ② → ⑤ → 終了

【備考】
