

レジメン番号	0447	レジメン名	KRd 療法 2-12 サイクル
登録診療科	血液内科	使用薬剤	カイプロリス、レブラミド、デキサート/レナデックス
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2 (/)		Day8 (/)	Day9 (/)		Day15 (/)	Day16 (/)		Day21 (/)	Day22 (/)	4 週間を 1 クール	
カイプロリス 27mg/m ²	点滴	mg	↓	↓		↓	↓		↓	↓					
レブラミド 25mg/日 ※1	経口	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
デキサート 20mg または 40mg	点滴	mg	↓			↓			↓						
レナデックス 20mg または 40mg	経口	mg											↓		

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① カイプロリス	10mg	5%ブドウ糖 50mL (10mg は 1V5ml、40mg は 1V20ml 注射用水で溶解)	10 分/点滴
	40mg		
② デキサート	3.3mg	生食 100ml	15 分/点滴
③ 5%ブドウ糖液	100mL		メインルート/点滴

投与間隔≫ ※3 (メインルート) (15分) (10分)
 投与順番≫ ③ → ② → ① → 終了

【備考】

※1 レブラミドは 5-25mg の範囲で調節

※2 ③5%ブドウ糖液 100mL(メインルート) (Day1・2・8・9・15・16)