

レジメン番号	0472	レジメン名	DBd 療法 4-8 サイクル
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ダラザレックス、ベルケイド デキサート/レナデックス
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day4 (/)	Day5 (/)	Day8 (/)	Day9 (/)	Day11 (/)	Day12 (/)	…Day21
ダラザレックス 16mg/kg	点滴	mg	↓								3 週間を 1 コース
ベルケイド 1.3mg/m ² ※1	皮下 注	mg	↓		↓		↓		↓		
デキサメタゾン D1-D14 に 80mg/週 (原則 20mg/回) ※2	点滴 又は 経口	mg	↓	↓ (経口)	↓ (経口)	↓ (経口)	↓ (経口)	↓ (経口)	↓ (経口)	↓ (経口)	

(支持療法)

※3 Day1 経口剤あり

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ダラザレックス	100mg	生食 500ml	※4 下記参照/輸注ポンプ
	400mg		
② ベルケイド	3mg	生食 1.2ml	皮下注
③ デキサート	3.3mg	生食 100ml	15 分/点滴
④ 生食	500ml		メインルート/持続 50ml/h



【備考】

※1 ベルケイドの用量は 1.3mg/m²より開始し、毒性に応じて、1.0mg/m²、0.7mg/m²、投与中止に調節

※2 75 歳を超える、過少体重 (BMI : 18.5kg/m²未満)、コントロール不良の糖尿病又はステロイド療法

に対する忍容性がない、もしくは有害事象を発現した患者には、デキサメタゾンを 20mg/週で投与可

※3 ダラザレックス投与 1～3 時間前に、解熱鎮痛剤 (アセアミノフェン 1000mg) 及び抗ヒスタミン剤の予防投与を行う

※4 ダラザレックス投与速度

投与時期	希釈後の総量	投与開始からの投与速度 (ml/h)			
		0～1 時間	1～2 時間	2～3 時間	3 時間以降
3 回目投与以降	500ml	100 ^{注1}	150	200	

注 : 初回及び 2 回目投与時に最終速度が 100ml/h 以上で infusion reaction が認められなかった場合、100ml/h から開始することができる。