

レジメン番号	0625	レジメン名	R-Venetoclax 2-6 コース目
登録診療科	血液内科	使用薬剤	リツキサン/リツキシマブ BS、ベネクレクスタ
がん腫	慢性リンパ性白血病	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day28	Day1 ( / )
リツキサン 500 mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	4 週間を 1 コース	↓
ベネクレクスタ 400mg/日	経口	400mg	↓	↓	↓

(支持療法)

※1 経口剤あり

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①リツキサン/リツキシマブ BS	100mg	生食で 10 倍希釈	※2 下記参照/輸注ポンプ
	500mg		
②5%ブドウ糖	500ml		メインルート/点滴

投与間隔>

(メインルート)

(※2 指示通り/側管)

投与順番>

②

→

①

→

終了

【備考】

※1 リツキサン/リツキシマブ BS 投与前、解熱鎮痛剤及び抗ヒスタミン剤の予防投与を行う

※2 初回投与時は、最初の 30 分は 50mg/時の速度で点滴静注を開始し、患者の状態を十分観察しながら、

その後注入速度を 30 分毎に 50mg/時ずつ上げて、最大 400mg/時まで速度を上げることができる。

また、2 回目以降の注入開始速度は、初回投与時に発 現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて

開始し、その後 30 分毎に 100mg/時ずつ上げて、最大 400mg/時まで上げることができる。