

| | | | |
|--------|-------|----------|------------------|
| レジメン番号 | 0626 | レジメン名 | CDDP+VCR 療法(D15) |
| 登録診療科 | 脳神経外科 | 使用薬剤 | シスプラチン、オンコビン |
| がん腫 | 神経膠腫 | インターバル日数 | 28 日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 | Day2~5 | Day8 | 入院で 実施済み | Day15 (/) | …Day28 | Day1 | |
|-------------------------------------|------|-------|------|--------|------|-------------|----------------|--------|----------------|-----|
| シスプラチン(CDDP) 20mg/m ² | 点滴 | mg | (↓) | (↓) | | | | | 4 週間を 1 クール | (↓) |
| オンコビン(VCR) 1.4mg/m ² | 点滴 | mg | (↓) | | (↓) | | ↓ | (↓) | | |

(支持療法)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|-----|-----|-----|-------------|---|----------------|-----|
| グラニセトロン 1mg/body | 点滴 | 1mg | (↑) | (↑) | (↑) | 入院で 実施済み | ↑ | 4 週間を 1 クール | (↑) |
| デキサート 6.6mg/body | 点滴 | 6.6mg | (↑) | (↑) | (↑) | | ↑ | | (↑) |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|--------------|---------|----------|-----------|
| ①オンコビン | 1mg | 生食 100mL | 30 分/点滴 |
| ② | デキサート | 生食 100mL | 15 分/点滴 |
| | グラニセトロン | | |
| ③生食 | 50ml | | 5 分/点滴 |
| ④YD ソリタ T3 号 | 200mL | | メインルート/点滴 |

(Day15)

投与間隔≫ (メインルート/2 時間) (側管/15 分) (側管/30 分) (側管/5 分)

投与順番≫ ④ → ② → ① → ③ → 終了

【備考】

.....

.....

.....

.....