

レジメン番号	108	レジメン名	MTX-LV
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	メソトレキセート、ロイコボリン
がん腫	絨毛性疾患	インターバル日数	18-22 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	Day4 (/)	Day5 (/)	Day6 (/)	Day7 (/)	Day8 (/)	…Day22	Day1 (/)
メソトレキセート(MTX) 1mg/kg	点滴	mg	↓		↓		↓		↓		3 週間を 1 コース	↓

(支持療法)

デキサート* 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑		↑		↑		3 週間を 1 コース	↑
A)パロノセトロン(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		↑		↑		↑			↑
ロイコボリン(3) 0.1mg/kg	点滴	mg		↑		↑		↑		↑		

*ステロイドは他剤へ変更・省略可

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①メソトレキセート	5mg	生食 100mL	60 分/点滴
	50mg		
②ロイコボリン	3mg	生食 100mL	30 分/点滴
③	デキサート	3.3mg	生食 100mL 30 分/点滴
	パロノセトロン	0.75mg 1mg	
	グラニセトロン		

★Day1,3,5,7

投与間隔≫ (30 分) (60 分)
投与順番≫ ③ → ① → 終了

★Day2,4,6,8

投与間隔≫ (30 分)
投与順番≫ ② → 終了

【備考】

休薬期間：通常 10～14 日。有害事象発現状況によって延長する可能性あり。