

レジメン番号	303	レジメン名	アバスチン+PLD+CBDCA
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	アバスチン、ドキシル、カルボプラチン
がん腫	卵巣癌	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day15 ( / )	・・・Day28	Day1 ( / )
アバスチン(Bev) 10mg/kg	点滴	mg	↓	↓	4週間を1コース	↓
ドキシル(PLD) 30mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓			↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓			↓

(支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑		4週間を1コース	↑
A) パロノセトロン(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アバスチン	100mg	生食 100mL	※下記参照/点滴
	400mg		
②ドキシル	20mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
③カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
④	パロノセトロン	生食 100mL	15分/点滴
	または グラニセトロン		
	デキサート		
⑤生食	50mL		5分/点滴

〈Day1〉

投与間隔≫ (※下記参照) (15分) (120分) (60分) (5分)  
 投与順番≫ ① → ④ → ② → ③ → ⑤ → 終了

〈Day15〉

投与間隔≫ (※下記参照) (5分)  
 投与順番≫ ① → ⑤ → 終了

【備考】

※アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分