

レジメン番号	306	レジメン名	CMF(CPA 点滴)
登録診療科	乳腺外科・内分泌外科	使用薬剤	エンドキサン、メソトレキセート、フルオロウラシル
がん腫	乳癌	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	…Day 28	Day1 ( / )
エンドキサン(CPA) 600mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓	4週間を1コース	↓
メソトレキセート(MTX) 40mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓		↓
フルオロウラシル(5-FU) 600mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

A)パロノセトロン (0.75) B)グラニセトロン (1)	点滴	mg	↑	↑	4週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①エンドキサン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
	500mg		
②メソトレキセート	5mg	生食 100mL	15分/点滴
	50mg		
③フルオロウラシル	250mg	生食 100mL	15分/点滴
④	パロノセトロン	生食 100mL	15分/点滴
	または グラニセトロン		
	デキサート		
⑤生食	50mL		5分/点滴

投与間隔>

(15分)

(15分)

(15分)

(30分)

(5分)

投与順番>

④

→

②

→

③

→

①

→

⑤

→

終了

【備考】

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---