

| | | | |
|--------|------------|----------|--------------------------------------|
| レジメン番号 | 311 | レジメン名 | HER+GT |
| 登録診療科 | 乳腺外科・内分泌外科 | 使用薬剤 | ハーセプチン/トラスツズマブ BS、 ジェムザール、パクリタキセル |
| がん腫 | 乳癌 | インターバル日数 | 21日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day8 (/) | …Day 21 | Day1 (/) |
|---|------|-------|---------------|---------------|----------|---------------|
| パクリタキセル(PTX) 80mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | ↓ | 3週間を1コース | ↓ |
| ジェムザール(GEM) 1250mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | ↓ | | ↓ |
| ハーセプチン/トラスツズマブ BS (HER) 初回 8mg/kg 以降 6mg/kg | 点滴 | mg | ↓ | | | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | | |
|--|----|----|---|---|----------|---|
| デキサート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | 3週間を1コース | ↑ |
| ファモチジン 20mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | | ↑ |
| ネオレスタール 10mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | | ↑ |
| A)パロノセトロン(0.75) B) グラニセトロン(1) | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| ①パクリタキセル | 30mg | 生食 250mL | 60分/点滴 | |
| | 100mg | | | |
| ②ジェムザール | 200mg | 生食 100mL | 30分/点滴 | |
| | 1000mg | | | |
| ③ハーセプチン/トラスツズマブ BS | 150mg | 生食 250mL | ※下記参照/点滴 | |
| ④ | デキサート 初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg | 3.3mg 生食 100mL | 15分/点滴 | |
| | ファモチジン | | | 20mg |
| | ネオレスタール | | | 10mg |
| ⑤ | パロノセトロン または グラニセトロン | 0.75mg 1mg | 生食 100mL 30分/点滴 | |
| | ⑥ 生食 | 50mL | | 5分/点滴 |

投与間隔>

(15分)

(30分)

(※下記参照)

(60分)

(30分)

(5分)

投与順番>

④

→

⑤

→

③

→

①

→

②

→

⑥

→

終了

【備考】

※HER 投与速度：初回 90分、2回目以降 30分まで短縮可能