

レジメン番号	439	レジメン名	アバスチン+PTX+TOP
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	アバスチン、パクリタキセル、ハイカムチン
がん腫	子宮頸癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day2 ( / )	Day3 ( / )	…Day21	Day1 ( / )
パクリタキセル(PTX) 175mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓			3週間を1コース	↓
ハイカムチン(TOP) 0.75mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓	↓		↓
アバスチン(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

デキサート Day1 19.8mg/body Day2・3 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	3週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	mg	↑				↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	mg	↑				↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①パクリタキセル	30mg	生食 500mL	3時間/点滴
	100mg		
②ハイカムチン	1.1mg	生食 100mL	30分/点滴
③アバスチン	100mg	生食 100mL	下記参照/点滴
	400mg		
④	デキサート 3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン 20mg		
	ネオレスタール 10mg		
⑤グラニセトロン	1mg	生食 100mL	30分/点滴
⑥	グラニセトロン 1mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑦ 生食	50mL		5分/点滴

【day1】

投与間隔≫ (下記参照) (15分) (30分) (3時間) (30分) (5分)  
 投与順番≫ ③ → ④ → ⑤ → ① → ② → ⑦ → 終了

【day2,3】

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分)  
 投与順番≫ ⑥ → ② → ⑦ → 終了

【備考】

※アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分

