

レジメン番号	0689	レジメン名	レミトロ
登録診療科	血液内科	使用薬剤	レミトロ
がん腫	末梢性 T 細胞リンパ腫 皮膚 T 細胞リンパ腫	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	Day4 (/)	Day5 (/)	…Day21	Day1 (/)
レミトロ 9μg/kg	点滴	μg	↓	↓	↓	↓	↓	3 週間を 1 コース	↓

(支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑	↑	↑	↑	3 週間を 1 コース	↑
---------------------	----	-------	---	---	---	---	---	-------------	---

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レミトロ	300μg	生食 100ml 1V あたり注射用水 2.1ml で溶解 3μg/ml 以上となるよう希釈	60 分/点滴
②デキサート	3.3mg	生食 100ml	15 分/点滴
③生食	250mL		60 分/点滴
④生食	250mL		60 分/点滴

投与間隔≫ (メインルート /50ml/hr) (側管 15 分) (側管 60 分) (側管 60 分) (側管 60 分)

投与順番≫ ⑤ → ② → ③ → ① → ④ → 終了

【備考】

⑤メインルート：生食 250ml 上記はすべて側管から投与する。

レミトロ開始 30 分前に、クロルフェニラミン錠 6mg,アセトアミノフェン錠 500mg を服用

・最大 8 サイクルまで