

レジメン番号	301	レジメン名	アバスチン+GC
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	アバスチン、ジェムザール、カルボプラチン
がん腫	卵巣癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
アバスチン (Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓		3週間を1コース	↓
ジェムザール(GEM) 1,000mg/m ²	点滴	mg	↓	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=4 : Calvert 式)	点滴	mg	↓			↓
(支持療法)						
A)パロノセトロン(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		3週間を1コース	↑
グラニセトロン(1)	点滴	mg		↑		
デキサート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アバスチン		100mg	生食 100mL	※下記参照/点滴
		400mg		
②ジェムザール		200mg	生食 100mL	30分/点滴
		1,000mg		
③カルボプラチン		50mg	生食 250mL	60分/点滴
		150mg		
④	アロキシ(Day1のみ)	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	グラニセトロン	1mg		
	デキサート	3.3mg		
	初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg			
⑤ 生食		50mL		5分/点滴

<Day1>

投与間隔>> (※下記参照) (15分) (30分) (60分) (5分)
 投与順番>> ① → ④ → ② → ③ → ⑤ → 終了

<Day8>

投与間隔>> (15分) (30分) (5分)
 投与順番>> ④ → ② → ⑤ → 終了

【備考】

※アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分