

レジメン番号	266	レジメン名	CPT-N 療法
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	トポテシン、アクプラ
がん腫	子宮頸癌	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	…Day28	Day1 ( / )
アクプラ(NED) 80mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓		4 週間を 1 コース	↓
トポテシン(CPT-11) 60mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

デキサート 8mg/body	点滴	mg	↑	↑	4 週間を 1 コース	↑
A) パロノセトロン(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アクプラ	50mg	生食 500mL	120 分/点滴
②トポテシン	40mg	生食 500mL	120 分/点滴
	100mg		
③	デキサート	4mg	30 分/点滴
	パロノセトロン	0.75mg	
	または グラニセトロン		
④ラクテック	500mL	ラクテック 500mL	120 分/点滴

< Day1 >

投与間隔≫ (30分) (120分) (120分) (120分)  
 投与順番≫ ③ → ② → ① → ④ → 終了

< Day8 >

投与間隔≫ (30分) (120分)  
 投与順番≫ ③ → ② → 終了

【備考】

---



---



---



---



---



---