

レジメン番号	0693	レジメン名	RAM+IRI
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	サイラムザ、トポテシン
がん腫	胃癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
サイラムザ(RAM) 8mg/kg	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
トポテシン(IRI) 150mg/m ²	点滴	mg	↓		↓

支持療法

デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	2週間を1コース	↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
A)グラニセトロン(1mg) B)パロノセトロン (0.75mg)	点滴	を mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①サイラムザ	500mg	生食 250mL	60分/点滴 ※1
②トポテシン	40mg	生食 250mL	90分/点滴
	100mg		
③	デキサート 3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	ネオレスタール 10mg		
④	グラニセトロン 1mg	生食 100mL	30分/点滴
	パロノセトロン または 0.75mg		
⑤ 生食	50mL		5分/点滴

投与間隔≫

(15分) (30分) (※1) (5分) (90分) (5分)

投与順番≫

③ → ④ → ① → ⑤ → ② → ⑤ → 終了

【備考】

※1 サイラムザ 投与速度：初回 60分/2回目以降 30分まで短縮可能