

レジメン番号	0560	レジメン名	DVMP 維持
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ダラザレックス、デキサート
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 ( / )	…Day28	Day1 ( / )
ダラザレックス 16mg/kg	点滴	mg	↓	1クール 28日	↓
デキサート 20mg/body	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

※1 Day1 経口剤あり

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ダラザレックス	100mg	生食 500mL	※2 下記参照/輸注ポンプ
	400mg		
② デキサート	3.3mg	生食 100ml	15分/点滴

投与間隔≫ ※3(メインルート/持続) (側管 15分) (側管※)  
 投与順番≫ ③ → ② → ① → 終了

【備考】

※1 ダラザレックス投与 1～3 時間前に、解熱鎮痛剤（アセトアミノフェン 1000mg）及び抗ヒスタミン剤の  
 予防投与を行う

※2 ダラザレックス投与速度

投与時期	希釈後の総量	投与開始からの投与速度 (ml/h)			
		0～1 時間	1～2 時間	2～3 時間	3 時間以降
初回投与	1000ml	50	100	150	200
2 回目投与	500ml 注1				
3 回目投与以降	500ml	100 注2	150	200	

注 1：初回投与開始時から 3 時間以内に infusion reaction が認められなかった場合、500mL とすることができる。

注 2：初回及び 2 回目投与時に最終速度が 100mL/h 以上で infusion reaction が認められなかった場合、  
 100mL/h から開始することができる。

※3 ③生食 500mL メインルート