

レジメン番号	0591	レジメン名	A+CHP 療法
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ドキシソルビシン、エンドキサン、アドセトリス、プレドニゾロン
がん腫	末梢性 T 細胞リンパ腫	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day21	Day1 ( / )
ドキシソルビシン(DXR) 50mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
エンドキサン(CPA) 750mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
アドセトリス 1.8mg/kg	点滴	mg	↓		↓
プレドニゾロン(PSL) 100mg/body	経口	mg	D1~5		D1~5

(支持療法)

A) パロノセトロン (0.75mg) B) グラニセトロン (1mg)	点滴	○ を mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
---	----	--------	---	-------------	---

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ドキシソルビシン	10mg	生食 100ml	15 分/点滴
	50mg		
②エンドキサン	100mg	生食 250ml	1 時間/点滴
	500mg		
③アドセトリス	50mg	※2 下記参照	30 分/点滴
④注射用蒸留水	100ml		アドセトリス溶解用
⑤ パロノセトロン または グラニセトロン	0.75mg	生食 100ml	15 分/点滴
	1mg		
⑥生理食塩水	50mL		5 分/点滴

投与間隔>> (メインルート/50mL/hr)

※1

(側管 15 分)

(側管 15 分)

(側管 1 時間)

(側管 5 分)

(側管 30 分)

投与順番>> ⑦ → ⑤ → ① → ② → ⑥ → ③ → 終了

【備考】

※1 ⑦メインルート：生食 250mL 上記はすべて側管から投与する

※2 アドセトリスの希釈生食量

- ・体重 60kg 未満の場合は生食 100ml で希釈
- ・体重 60kg 以上 85kg 未満の場合は生食 100ml または 250ml で希釈
- ・体重 85kg 以上の場合は生食 250ml で希釈