

レジメン番号	637	レジメン名	FCR (CLL) 2-6 コース目
登録診療科	血液内科	使用薬剤	リツキサン/リツキシマブ、フルダラ エンドキサン
がん腫	慢性リンパ性白血病	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day0 (/)	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	…Day28	Day0 (/)	Day1 (/)
リツキサン/リツキシマブ BS(R) 500mg/m ²	点滴	mg	(↓)	↓			4週間を1コース	(↓)	↓
フルダラ 25mg/m ²	点滴	mg		↓	↓	↓			↓
エンドキサン(CPA) 250mg/m ²	点滴	mg		↓	↓	↓			↓

(支持療法)

グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg		↑	↑	↑	4週間を1コース		↑
---------------------	----	-----	--	---	---	---	----------	--	---

《薬剤調製》

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①リツキサン/リツキシマブ BS	100mg	生食で10倍希釈	医師の指示通り /輸注ポンプ※下記参照
	500mg		
②フルダラ	50mg	生食100mL (1Vあたり5mlの注射用水で溶解)	30分/点滴
③エンドキサン	100mg	生食250mL	2時間/点滴
	500mg		
④5%ブドウ糖液	500mL		メインルート
⑤生食	250mL		メインルート
⑥グラニセトロン	1mg	生食100mL	30分/点滴
⑦生食	50mL		5分/点滴

【当日の投与方法】

《Day0 (R : Day0 投与の場合)》

投与間隔》 (メインルート) ※ (側管/5分)
 投与順番》 ④ → ① → ⑦ → 終了

《Day1 (R : Day0 投与の場合)、Day2、Day3》

投与間隔》 (メインルート) (側管/30分) (側管/30分) (側管/2時間) (側管/5分)
 投与順番》 ⑤ → ⑥ → ② → ③ → ⑦ → 終了

《Day1 (R : Day1 投与の場合)》

投与間隔》 (メインルート) ※ (側管/30分) (側管/30分) (側管/2時間) (側管/5分)
 投与順番》 ④ → ① → ⑥ → ② → ③ → ⑦ → 終了

【備考】

・リツキサン/リツキシマブ開始30分前に、クロルフェニラミン錠6mg、アセトアミノフェン錠500mgを服用

※リツキサン投与速度：

初回投与時、最初の30分は50mg/hで開始し、患者の状態を十分観察しながら、

注入速度を30分毎に50mg/hずつ上げて、最大400mg/hまで速度を上げることができる。

2回目以降の投与速度：

初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/hで開始し、その後30分毎に100mg/hずつ上げて、

最大400mg/hまで上げることができる。