

レジメン番号	683	レジメン名	Pola-BR(1 コース目)
登録診療科	血系内科	使用薬剤	リツキサン/リツキシマブ、ポライビー トレアキシン
がん腫	DLBCL	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day 2 (/)	Day 3 (/)	…Day21
リツキサン/リツキシマブ BS 375 mg/m ²	点滴	mg	↓			3 週間を 1 コース
ポライビー 1.8mg/kg	点滴	mg		↓		
トレアキシン(bendamustine) 90mg/m ²	点滴	mg		↓	↓	

(支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg		↑		3 週間を 1 コース
デキサート ※※ 16.5mg/body(day1) 6.6mg/body(day2.3)	点滴	左欄参照	↑	↑	↑	

《薬剤調製》

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①リツキサン/リツキシマブ BS	100mg	生食で 10 倍希釈	医師の指示通り ※下記参照/輸注ポンプ
	500mg		
②トレアキシン	100mg	生食 250ml	60 分/点滴
③ポライビー	30mg	生食 100ml	90 分/点滴
	140mg		
④ アロキシ デキサート	0.75mg	生食 100ml	30 分/点滴
	3.3mg		
⑤ デキサート	3.3mg	生食 100ml	30 分/点滴 ※※投与量上記参照
⑥ 生食	50mL		5 分/点滴

【当日の投与方法】

【day1】

投与間隔≫ (メインルート/持続) (側管/30 分) ※ (側管/5 分)
 投与順番≫ ⑦ → ⑤ → ① → ⑥ → 終了

【day2】

投与間隔≫ (メインルート/持続) (側管/30 分) (側管/60 分) (側管/90 分) (側管/5 分)
 投与順番≫ ⑦ → ④ → ② → ③ → ⑥ → 終了

【day3】

投与間隔≫ (メインルート/持続) (側管/30 分) (側管/60 分) (側管/5 分)
 投与順番≫ ⑦ → ⑤ → ② → ⑥ → 終了

【備考】

⑦生食 500mL (メインルート) 上記はすべて側管から投与する。

①※リツキサン投与速度：初回は 50mg/hr で開始し、患者の状態を確認しながら。30 分毎に 50mg/hr ずつ上げて、
 最大 400mg/hr まで上げることができる。

リツキサン開始 30 分前に、クロルフェニラミン TR 錠 6mg,アセトアミノフェン錠 500mg を服用

ポライビー開始 30 分前に、クロルフェニラミン TR 錠 6mg,アセトアミノフェン錠 500mg を服用