

レジメン番号	684	レジメン名	Pola-BR(2-6 コース目)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	リツキサン/リツキシマブ BS、ポライビー、トリアキシン
がん腫	DLBCL	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	…Day21	Day1 (/)
リツキサン/リツキシマブ BS 375 mg/m ²	点滴	mg	↓		3 週間を 1 コース	↓
ポライビー 1.8mg/kg	点滴	mg	↓			↓
トリアキシン(bendamustine) 90mg/m ²	点滴	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑		3 週間を 1 コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑		↑

《薬剤調製》

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①リツキサン/リツキシマブ BS	100mg	生食で 10 倍希釈	医師の指示通り ※下記参照/ 輸注ポンプ
	500mg		
②トリアキシン	100mg	生食 250ml	60 分/点滴
③ポライビー	30mg	生食 100ml	※※下記参照/点滴
	140mg		
④	パロノセトロン 0.75mg	生食 100ml	30 分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑤	デキサート 3.3mg	生食 100ml	30 分/点滴
⑥	生食 50mL		5 分/点滴

【当日の投与方法】

【day1】

投与
間隔>> (メインルート/持続) (側管/30 分) (側管/60 分) ※ ※※ (側管/5 分)

投与
順番>> ⑦ → ④ → ② → ① → ③ → ⑥ → 終了

【day2】

投与間隔>> (メインルート/持続) (側管/30 分) (側管/60 分) (側管/5 分)

投与順番>> ⑦ → ⑤ → ② → ⑥ → 終了

【備考】

⑦生食 500mL (メインルート) 上記はすべて側管から投与する。

①※リツキサン投与速度：初回は 50mg/hr で開始し、患者の状態を確認しながら。30 分毎に 50mg/hr ずつ上げて、最大 400mg/hr まで上げることができる。問題なければ 2 回目以降 100mg/hr より開始し、30 分ごとに 100mg/hr ずつ上げ最大 400mg/hr まで上げることができる

③※※ポライビー投与速度：初回 90 分、2 回目以降 30 分まで短縮可

Day1 リツキサン開始 30 分前に、クロルフェニラミン TR 錠 6mg,アセトアミノフェン錠 500mg を服用