

| | | | |
|--------|--------|----------|---------------------|
| レジメン番号 | 0696 | レジメン名 | DLd7 サイクル以降(ダラキューロ) |
| 登録診療科 | 血液内科 | 使用薬剤 | ダラキューロ、レナデックス |
| がん腫 | 多発性骨髄腫 | インターバル日数 | 28日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者 投与量 | Day1 (/) | Day2 (/) | ... | Day8~14 | Day15~21 | Day22~28 | Day1 (/) |
|----------------------------|------|-----------|---------------|---------------|-----|---------|----------|--------------|---------------|
| ダラキューロ 配合皮下注 1V/body | 皮下注 | 1V | ↓ | | | | | 4週間を 1コース | ↓ |
| レブラミド 25mg/日 | 経口 | mg | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | ↓ |
| レナデックス 20mg/body | 経口 | mg | ↓ | ↓ | | | | | ↓ |
| レナデックス 40mg/週 (※2) | 経口 | mg | | | | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-------------------|----|-------|---------|
| ① ダラキューロ 配合皮下注 | | | 皮下注(※1) |

(Day1)

投与間隔>>

(皮下注)

①開始 1~3 時間前に

アセトアミノフェン 500mg 2T

投与順番>>

d-クロルフェニラミン 6mg 1T

レナデックス 4mg 5T

を内服

①

→

終了

【備考】

※1 臍から左又は右に約 7.5 cm の腹部皮下に、本剤 15 mL を約 3~5 分かけて投与する。

※2 day8-14、day15-21、day22-28 にデキサメタゾン (レナデックス) 40mg/週を経口投与 (1-2 回に分割)

