

レジメン番号	0698	レジメン名	DBd4-8 サイクル(ダラキューロ)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ダラキューロ、ベルケイド レナデックス
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day4 (/)	Day5 (/)	Day8 (/)	Day9 (/)	Day11 (/)	Day12 (/)	...	Day21 (/)	Day1 (/)
ダラキューロ 配合皮下注 1V/body	皮下注	V	↓										↓
ベルケイド 1.3mg/m ²	皮下注	mg	↓		↓		↓		↓				↓
レナデックス D1-D14に 80mg/週 (原則 20mg/回) (D15 医師判断で実施)	経口	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			↓

3 週間を
1 コース

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ダラキューロ 配合皮下注			皮下注(※1)
② ベルケイド	3mg	生食 1.2mL	皮下注

(Day1)

投与間隔≫

(皮下注)

(皮下注)

①開始 1～3 時間前に
アセトアミノフェン 500mg 2T
投与順番≫ d-クロルフェニラミン 6mg 1T
レナデックス 4mg 5T
を内服

① → ② → 終了

(Day4,8,11)

投与間隔≫

(皮下注)

投与順番≫

② → 終了

【備考】

※1 臍から左又は右に約 7.5 cm の腹部皮下に、本剤 15 mL を約 3～5 分かけて投与する。