

レジメン番号	701	レジメン名	DCd療法 2サイクル (ダラキューロ)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	カイプロリス、ダラキューロ
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day8 (/)	Day9 (/)	Day15 (/)	Day16 (/)	Day22 (/)	…Day28
カイプロリス 56mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓		4週間を 1クール
ダラキューロ 配合皮下注 1V/body	皮下注	1V	↓		↓		↓		↓	
デキサート 20mg/日	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
レナデックス 40mg/日	経口	mg							↓	

《薬剤調製》


薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①カイプロリス	10mg	5%ブドウ糖 100mL (10mg は 1V5ml、40mg は 1V20ml 注射用水で溶解)	30分/点滴
	40mg		
②ダラキューロ配合皮下注			皮下注(※)
③デキサート	3.3mg	5%ブドウ糖 100ml	30分/点滴
④生食	50mL		5分/点滴

【当日の投与方法】


《Day1.8.15》②開始 1～3 時間前(①投与前)にアセトアミノフェン 500mg 2T/d・クロルフェニラミン 6mg 1T/モンテルカスト 10mg 1T を内服



《Day2.9.16.》



《Day22》



【備考】

⑥5%ブドウ糖 100mL(メインルート)

②※臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に、本剤 15mL を約 3～5 分かけて投与する。