

レジメン番号	703	レジメン名	DCd療法 7サイクル以降 (ダラキューロ)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	カイプロリス、ダラキューロ
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 ( / )	Day2 ( / )	Day8 ( / )	Day9 ( / )	Day15 ( / )	Day16 ( / )	Day22 ( / )	…Day28	Day1 ( / )
カイプロリス 56mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓		4週間を 1クール	↓
ダラキューロ 配合皮下注 1V/body	皮下注	1V	↓								↓
デキサート 20mg/日	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓			↓
レナデックス 40mg/日	経口	mg							↓		

《薬剤調製》

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①カイプロリス	10mg	5%ブドウ糖 100mL (10mgは1V5ml、40mgは1V20ml 注射用水で溶解)	30分/点滴
	40mg		
②ダラキューロ配合皮下注			皮下注(※)
③デキサート	3.3mg	5%ブドウ糖 100ml	30分/点滴
④生食	50mL		5分/点滴

【当日の投与方法】

《Day1》 ②開始 1～3 時間前(①投与前)にアセトアミノフェン 500mg 2T/d-クロルフェニラミン 6mg 1T/モンテルカスト 10mg 1T を内服

投与間隔》 (メインルート 50ml/h) (30分) (30分) (5分) (皮下注※)

投与順番》 ⑥ → ③ → ① → ④ → ② → 終了

《Day2.8.9.15.16.》

投与間隔》 (メインルート 50ml/h) (30分) (30分) (5分)

投与順番》 ⑥ → ③ → ① → ⑤ → 終了

【備考】

⑥5%ブドウ糖 100mL(メインルート)

②※臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に、本剤 15mL を約 3～5 分かけて投与する。