

レジメン番号	708	レジメン名	LCH-19 MS-Maintenance I +i(wk15-22,23-30)
登録診療科	小児科	使用薬剤	メソトレキセート、オンコビン、キロサイド、プレドニゾロン
がん腫	ランゲルハンス細胞組織球症	インターバル日数	56日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day2-4	Day15 ( / )	Day16-17	Day29 ( / )	Day30-32	Day43 ( / )	Day44-45	…Day56
メソトレキセート(MTX) 20mg/m <sup>2</sup>	静注	mg			↓				↓		8週間を 1コース
オンコビン(VCR) 1.5mg/m <sup>2</sup> (MAX2mg)	点滴	mg	↓				↓				
キロサイド(AraC) 150mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓				↓				
プレドニゾロン(PSL) 40mg/m <sup>2</sup>	経口	mg	↓	↓↓	↓	↓↓	↓	↓↓	↓	↓↓	

(支持療法)

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day2-4	Day15 ( / )	Day16-17	Day29 ( / )	Day30-32	Day43 ( / )	Day44-45	…Day56
グラニセトロン 40μg/kg(MAX1mg)	静注	mg	↑		↑		↑		↑		8週間を 1コース

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① メソトレキセート	50mg	生食 20mL	緩徐/静注
② オンコビン	1mg	生食 50mL	15分/点滴
③ キロサイド	40mg	生食 250mL	2時間/点滴
③ グラニセトロン	1mg	生食 20mL	緩徐/静注
④ 生食	50mL		5分/点滴
⑤ 生食	100ml		メインルート/持続

【Day1,29】

投与間隔≫ (メインルート/20ml/h) (静注) (15分) (2時間) (5分)  
 投与順番≫ ⑤ → ③ → ② → ③ → ④ → 終了

【Day15,43】

投与間隔≫ (メインルート/20ml/h) (静注) (静注)  
 投与順番≫ ⑤ → ③ → ① → 終了

【備考】

プレドニゾロン：40mg/m<sup>2</sup>/分 3内服（ファモチジン併用）（点滴投与量；等量）

Day1-4(4日)、Day15-17(3日)、Day29-32(4日)、Day43-45(3日)