

レジメン番号	0584	レジメン名	EPd 療法 1・2 サイクル
登録診療科	血液内科	使用薬剤	エムプリシティ、デキサート、ポマリスト
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	Day21 (/)	Day22 (/)	Day1 (/)
エムプリシティ 10mg/kg	点滴	mg	↓	↓	↓		↓	↓
デキサート 33mg/body	点滴	mg	↓	↓	↓		↓	↓
ポマリスト 4mg/日	経口	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓

(支持療法)

※1 Day1 経口剤あり

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①エムプリシティ	300mg	生食 250mL ※2 (300mg は 1V13ml、400mg は 1V17ml 注射用水で溶解)	※3 下記参照/輸注ポンプ
	400mg		
②デキサート	3.3mg	生食 100ml	15分/点滴 ※4



【備考】

※1 エムプリシティ投与 30 分前に、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤及び H2 受容体拮抗剤を予防投与する。

※2 ①体重 50 kg 未満の場合は 150mL、90 kg 超の場合は 350mL に希釈する。

※3 エムプリシティ投与速度

投与時期	投与速度 (mL/分)		
	投与開始 0~30 分	投与開始 30~60 分	投与開始 60 分以降
第 1 サイクル	初回投与	0.5	1
	2~4 回目投与	3	4
第 2 サイクル以降		5	

※4②エムプリシティ投与 45 分前までに投与終了

※5③メインルート：生食 250mL